

Autors i Filiació : Yolanda Osuna Gomera, Griselda Moya Calaf, Anna Mulero Madrid, M^a Àngels Peroy Mestre (CASAP Can Bou); M^a Dolors Bages Crusat, Marien Miñano Cárceles (ICS El Castell)

INTRODUCCIÓ:

La primera dosi de la vacuna del xarampió a la Comunitat de Catalunya està indicada als 15 mesos d'edat. A Castelldefels es va produir un brot de xarampió afectant un total de 28 casos, la majoria en menors de 15 mesos.

OBJECTIU:

Descripció de la intervenció enfront a un brot de xarampió que es va iniciar al desembre del 2006 a Castelldefels.

MATERIAL I MÈTODES:

Descripció de la intervenció:

La unitat d'epidemiologia es va posar en contacte amb els CAPs, i amb els casos i contactes. Un equip d'atenció primària va fer una reunió informativa als pares i mares de la llar d'infants on es va detectar el 1er cas. Es va contactar telefònicament amb els pares dels nens entre 9-15 mesos i els contactes directes, per a la vacunació.

Es va millorar l'accessibilitat de la població amb la creació de noves agendes i incrementant el personal per la vacunació.

Variables d'estudi:

Es va recollir el nombre de nens entre 9-15 mesos i el nombre de contactes directes amb els que es va contactar.

Es va calcular la cobertura vacunal dels nens entre 9-15 mesos i la dels contactes, utilitzant com a denominador el nombre d'individus amb els que es va contactar per cada grup.

RESULTATS

Es va contactar telefònicament amb 347 nens entre 9-15 mesos i a 216 contactes directes. Es va vacunar a un 81,2% dels nens entre 9-15 mesos i a un 87,5% dels contactes. En total es va vacunar al 83,6% (471 individus) del total que es va contactar telefònicament.

CONCLUSIONS

La població va respondre amb una bona acceptació a la intervenció amb una bona cobertura vacunal. La resposta ràpida dels CAP va fer disminuir l'alarma social dels primers dies.